

Allium tuberosum – Schnittknoblauch



Allium tuberosum entwickelt sich im ersten Jahr eher zögerlich und blüht erst im zweiten Jahr nach der Aussaat. Er wächst aufrecht in grasartigen Büscheln mit flachen Halmen. Von August bis September erscheinen auf festen, fast drahtartigen Stielen sternförmige, weisse Blüten in lockeren Scheindolden. Sie locken zahlreiche Insekten an. Sowohl die Blatthalme als auch die Blütenknospen sind essbar.

In der Erscheinung ähnelt der Schnittknoblauch dem Schnittlauch, die Blatthalme haben jedoch ein herzhaft-süßliches Knoblaucharoma.

Zieht im Winter ein und treibt im Frühjahr neu aus.

Familie: Amaryllidaceae - Amaryllisgewächse

Wuchs: buschig

Höhe: 40-50cm

Blüte: weiss

Standort: sonnig bis halbschattig. Nährstoffreicher, gleichmässig feuchter Boden.

Langlebigkeit: mehrjährig

Verwendung: Als Würzkraut, Blätter, Knospen und Blüten in der Küche zur Aromagebung und als Dekoration.

Aussaat:

- Direkte Aussaat: von April bis August, direkt ins Freiland (wie Schnittlauch).
Aussaattiefe: 2cm
- Vorkultur: Empfehlenswert ist jedoch, Allium tuberosum in Töpfen ab Ende März in Aussaatschalen im Haus bei einer Temperatur von etwa 18 Grad Celsius vorzuziehen, denn die Sämlinge wachsen anfangs nur sehr langsam. Die Samen werden dünn mit Erde bedeckt. Aussaattiefe: 1cm
Nach etwa sechs Wochen werden die vorkultivierten Pflanzen büschelweise ins Beet gesetzt. Abstand zwischen den Pflanzengruppen 30cm. Die Pflanzen brauchen das erste Jahr um kräftig zu werden und blühen ab dem zweiten Jahr. Beerntet wird ab dem zweiten Jahr.